## 乳がん(トラスツズマブを含むレジメン)

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
乳がん	MA020010 MA030010	TRA+PTX連続療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	21日間
			パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1, 8, 15	
乳がん	MA020020 MA030020	TRA+PTX3/1療法	トラスツズマブ	8 mg/kg	点滴静注	1	28日間
			パクリタキセル	80 mg/m²	点滴静注	1, 8, 15	
回 七/	MA020031 MA030031	TRA+VNR療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	21 🗆 🖽
乳がん			ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1, 8	21日間
	MA020041 MA030041	TRA+CMF療法	トラスツズマブ	8 mg/kg	点滴静注	1	
四 七/			シクロホスファミド	500 mg/m²	点滴静注	1, 8	28日間
乳がん			メトトレキサート	40 mg/m²	点滴静注	1, 8	
			フルオロウラシル	500 mg/m²	点滴静注	1, 8	
乳がん	MA020050 MA030050	TRA単独療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	21日間
771 <b>-</b> 13°1	MA020060	TRA+CPT-11療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	21日間
乳がん	MA030060		イリノテカン	100 mg/m²	点滴静注	1, 8	
乳がん	MA020070 MA030070	TRA+DTX(75)療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	21日間
			ドセタキセル	75 mg/m²	点滴静注	1	
	MA020081 MA030081	TRA+GEM+PTX療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	21日間
乳がん			ゲムシタビン	1250 mg/m²	点滴静注	1	
			パクリタキセル	175 mg/m²	点滴静注	1, 8	
回 七/	MA020091 MA030091	TRA+GEM療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	21日間
乳がん			ゲムシタビン	1250 mg/m²	点滴静注	1, 8	
回 七/	MA020100 MA030100	TRA+エリブリン療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	21日間
乳がん			エリブリン	1.4 mg/m²	点滴静注	1, 8	
回 七/	MA020110 MA020120 MA030110 MA030120	TRA+PER療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	21日間
乳がん			ペルツヅマブ	初回 840 mg, 2回目以降 420 mg	点滴静注	1	
	MA020130 MA020140 MA030130 MA030140	TRA+PER療法+DTX(75)療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	
乳がん			ペルツヅマブ	初回 840 mg,2回目以降 420 mg	点滴静注	1	21日間
			ドキタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1	
	MA030150 MA030160 MA020150 MA020160	TRA+PER療法+PTX連続療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	
乳がん			ペルツヅマブ	初回 840 mg,2回目以降 420 mg	点滴静注	1	21日間
			パクリタキセル	80 mg/m²	点滴静注	1, 8, 15	
<u>乳</u> がん	MA020170	T-DM1療法	トラツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	点滴静注	1	21日間

乳がん	MA020180	T-DXd療法	トラスツズマブ デルクステカン	5.4 mg/kg	点滴静注	1	21日間
乳がん	MA020190	T-DM1療法(術後化学療法)	トラツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	点滴静注	1	21日間