

## ホジキンリンパ腫

※主に入院で実施するレジメンについては省略しています。

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
ホジキンリンパ腫	BL010010	ABVD療法	ドキシルピシン ブレオマイシン ビンブラスチン ダカルバジン	25 mg/m <sup>2</sup> 9 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/m <sup>2</sup> 375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	1, 15 1, 15 1, 15 1, 15	28日間
ホジキンリンパ腫	BL010020	C-MOPP療法	シクロホスファミド ビンクリスチン プロカルバジン プレドニゾン	650 mg/m <sup>2</sup> 1.4 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> /day 40 mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注 点滴静注 経口 経口	1, 8 1, 8 1~14 1~14	28日間
ホジキンリンパ腫	BL010070	アドセトリス単独療法	ブレントキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注	1	21日間
ホジキンリンパ腫	BL010081	Nivolumab単独療法(2週)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	1	14日間
ホジキンリンパ腫	BL010091	Escalated-BEACOPP療法	エトポシド ドキシルピシン シクロホスファミド ブレオマイシン ビンクリスチン プロカルバジン プレドニゾン	200 mg/m <sup>2</sup> 35 mg/m <sup>2</sup> 1250 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/m <sup>2</sup> 1.4 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> /day 40mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 経口 経口	1, 2, 3 1 1 8 8 1~14 1~14	21日間
ホジキンリンパ腫	BL010100	Pembrolizumab療法(3週)	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	1	21日間
ホジキンリンパ腫	BL010110	A-AVD療法	ブレントキシマブ ベドチン ドキシルピシン ビンブラスチン ダカルバジン	1.2 mg/kg 25 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/m <sup>2</sup> 375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	1, 15 1, 15 1, 15 1, 15	28日間
ホジキンリンパ腫	BL010120	Pembrolizumab療法(6週)	ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	1	42日間
ホジキンリンパ腫	BL010130	Nivolumab単独療法(4週)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	1	28日間