

大腸がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
大腸がん	GI050011	mFOLFOX6療法	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	GI050021	sLV5FU2療法	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1~2	14日間
大腸がん	GI050031	mFOLFOX7療法	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル	200 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1~2	14日間
大腸がん	GI050041	5FU/LV療法	レボホリナート フルオロウラシル	200 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 持続点滴静注	1 1~2	14日間
大腸がん	GI050051	FOLFIRI療法	レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	GI050060	CAPOX療法	オキサリプラチン カベシタピン	130 mg/m ² 2000 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1 1~14	21日間
大腸がん	GI050070	IRIS療法	イリノテカン S-1	125 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1,15 1~14	28日間
大腸がん	GI050080	(切除不能進行・再発)SOX療法	オキサリプラチン S-1	130 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1 1~14	21日間
大腸がん	GI050092	ラムシルマブ+FOLFIRI療法	ラムシルマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	8 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	GI050100	CAPIRI療法	イリノテカン カベシタピン	200 mg/m ² 1600 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1 1~14	21日間
大腸がん	GI050122	5FU肝動注	フルオロウラシル	1500 mg/body	動注	1	7日間

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
大腸がん	GI050131	ザルトラップ+FOLFIRI療法	アプリベルセプトベータ	4 mg/kg	点滴静注	1	14日間
			レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	1	
			イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続点滴静注	1~2	
大腸がん	GI050141	FOLFOXIRI療法	イリノテカン	165 mg/m ²	点滴静注	1	14日間
			レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	1	
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	3200 mg/m ²	持続点滴静注	1~2	
大腸がん	GI050150	Nivolumab療法(2週)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	1	14日間
大腸がん	GI050160	Nivolumab療法(4週)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	1	28日間
大腸がん	GI050170	NIVO+IPI療法	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	1	21日間
			イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	1	
大腸がん	GI060012	Bev(5)+mFOLFOX6療法	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	1	14日間
			レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	1	
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続点滴静注	1~2	
大腸がん	GI060022	Bev(5)+FOLFIRI療法	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	1	14日間
			レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	1	
			イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続点滴静注	1~2	
大腸がん	GI060032	Bev(5)+sLV5FU2療法	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	1	14日間
			レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続点滴静注	1~2	
大腸がん	GI060042	Bev(5)+mFOLFOX7療法	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	1	14日間
			レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	1	
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続点滴静注	1~2	

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
大腸がん	GI060052	Bev(5)+FOLFOXIRI療法	ベバシズマブ イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル	5 mg/kg 165 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ² 3200 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	GI060061	ロンサーフ+Bev(5)療法	ベバシズマブ トリフルリジン・チピラシル	5 mg/kg 70 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1, 15 1~5, 8~12	28日間
大腸がん	GI070011	Bev(7.5)+CAPOX療法	ベバシズマブ オキサリプラチン カペシタビン	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 2000 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~14	21日間
大腸がん	GI070021	Bev(7.5)+カペシタビン療法	ベバシズマブ カペシタビン	7.5 mg/kg 2000 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1 1~14	21日間
大腸がん	GI070031	Bev(7.5)+SOX療法	ベバシズマブ オキサリプラチン S-1	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~14	21日間
大腸がん	GI070041	Bev(7.5)+CAPIRI療法	ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン	7.5 mg/kg 200 mg/m ² 1600 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~14	21日間
大腸がん	GI080010 GI080020	アービタックス単独療法	セツキシマブ	初回 400 mg/m ² , 以降 250 mg/m ²	点滴静注	1	7日間
大腸がん	GI080120 GI080130	エンコラフェニブ+ビニメチニブ +Cmab療法	セツキシマブ エンコラフェニブ ビニメチニブ	初回 400 mg/m ² , 以降 250 mg/m ² 300 mg/body/day 90 mg/body/day	点滴静注 経口 経口	1 連日 連日	7日間
大腸がん	GI080140 GI080150	エンコラフェニブ+Cmab療法	セツキシマブ エンコラフェニブ	初回 400 mg/m ² , 以降 250 mg/m ² 300 mg/body/day	点滴静注 経口	1 連日	7日間
大腸がん	GI090010	ベクティビックス単独療法	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	1	14日間
大腸がん	GI090021	ベクティビックス+mFOLFOX6療法	パニツムマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	6 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
			パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	1	

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
大腸がん	GI090031	ベクティビックス+ FOLFIRI療法	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	1	14日間
			イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	1	
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続点滴静注	1~2	